

# A BASE DE BRODIFACOU, ALTA EFICIÊNCIA COM A MENOR DOSE.



## EFICAZ NO CONTROLE DE RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS!

For Rat Granulado, é um raticida formulado com um potente ingrediente ativo e alta atratividade. Eficaz no controle de ratos, camundongos e ratazanas em áreas secas.

## VANTAGENS QUE SÓ FOR RAT GRANULADO TEM PARA VOCÊ!

- Contém substância amargante em sua formulação, prevenindo desta forma a ingestão do produto pelas espécies não alvo.
- Dose única.
- Aplicação fácil e segura.
- Indicado para áreas internas.

# FOR-RAT

**Dominus**

43 3432.9500 / [www.dominusquimica.com.br](http://www.dominusquimica.com.br)  
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial  
86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná

**EFICAZ NO CONTROLE DE ROEDORES**

# FOR-RAT

## FICHA TÉCNICA

**Princípio Ativo:** Brodifacoum.

**Nome Comercial:** For Rat Granulado.

**Grupo Químico:** Cumarínico (Compostos de ação anticoagulante, derivado das Hidroxicumarinas).

**Nome Químico:** 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftil]-4-hidroxicumarina.

**No CAS:** 56073-10-0.

**Tipo de Formulação:** Granulado (Pellets).

**Classe:** Rodenticida.

**Composição:** Brodifacoum.....0,005% p/p / Benzoato de denatonium..... 0,001% p/p / Ingredientes Inertes .....99,994% p/p.

**Solubilidade:** Produto solúvel em água / ingrediente ativo insolúvel.

**Estado Físico:** Sólido (Granulado).

**Modo de Ação:** Anticoagulante. Antagonista da vitamina K. Interrompe o ciclo de formação da Vitamina K, causando hemorragias. Inibe a formação de protombina e lesão capilar. A morte da espécie alvo, irá ocorrer entre 03 e 07 dias após a ingestão do produto em volume mínimo suficiente para a contaminação.

**Compatibilidade:** Incompatível com alimentos e quaisquer outros produtos químicos.

**Concentração de Uso:** For Rat Granulado está pronto para uso.

**Apresentação:** Sachês de 25g, saco plástico com 40 sachês de 25g.

### MODO DE USAR:

For Rat Granulado é altamente eficaz no controle de ratos e camundongos, em ambientes internos. Colocar as iscas nas tocas e demais locais onde os roedores vivem e transitam, em quantidades suficientes para que todos possam ter acesso. A quantidade de iscas pode variar de acordo com o nível de infestação no ambiente, bem como a área total a ser controlada. Como recomendação geral, orientamos colocar 01 Satche de 25g em cada toca ou ponto de iscagem. Distanciar aproximadamente 5 metros de um ponto de iscagem a outro, devendo totalizar entre 03 e 05 sachês a cada 10m<sup>2</sup>. Colocar as iscas de modo que os roedores tenham fácil acesso as mesmas, sem serem importunados, porém, evitar o fácil acesso a crianças ou animais domésticos. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados a cada 02 dias, no período de 01 semana. Fazer reaplicações nos locais onde houve consumo e nos locais onde não houve consumo, remanejar as iscas, repetindo esta ação, até que não haja mais consumo. Após terminada a desratização, recolher as iscas (sobras) dos locais onde foram aplicadas.

### APLICAÇÃO:

Aplicar 01 Satche de 25g de isca granulada por ponto de iscagem

e tocas. Totalizando 03 a 05 sachês a cada 10m<sup>2</sup>.

Ao aplicar o produto, utilize luvas.

Retirar os animais mortos da área de aplicação.

Recomenda-se a aplicação do produto utilizando-se caixa

porta isca, para evitar a contaminação de espécies não alvo.

Eficácia de For Rat Granulado contra as principais espécies de roedores e áreas urbanas

Espécie	Peso Médio	Dose Letal de For Rat
Ratazana (Rattus norvegicus)	400g	3,50g
Rato de Telhado (Rattus rattus)	250g	6,00g
Camundongo (Mus musculus)	20g	0,30g

### TOXICOLOGIA (PRODUTO FORMULADO)

DI50 oral aguda em ratos: > 2000mg/Kg

DI50 dermal aguda em ratos: > 2000mg/Kg

Toxicidade aguda para espécies não alvo

Quantidade de isca (g)	Espécies/Peso Médio			Porcos (~50Kg)
	Cães (~10Kg)	Gatos (~5Kg)	Ovelhas (~25Kg)	
50 - 200g		2.500 g	12.500 g	500 - 2.000g

### PRECAUÇÕES/RESTRIÇÕES DE USO:

Mantenham afastados da área de aplicação crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas. Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos. Não aplicar o produto sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do produto. Ao manipular o produto, utilize luvas impermeáveis. Tóxico para aves, peixes e outras espécies que fizerem alto consumo da isca. Apresenta baixa mobilidade no solo, uma vez que o ingrediente ativo (Brodifacoum) é insolúvel em água.

É fortemente ligado a partículas do solo, não sendo absorvido pelas plantas. A taxa de degradação irá variar de acordo com o tipo de solo. O produto quando utilizado e aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

### INDICAÇÕES DE USO MÉDICO:

**Grupo Químico:** Cumarinas - Compostos de ação anticoagulante.

**Nome Químico:** Brodifacoum.

**Ação Tóxica:** Fragilidade capilar e hemorragia (acúmulo de efeito).

**Antídoto/Tratamento:** Vitamina K1 e Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência: **CEATOX (55) 0800-771-3733.**

**Registro no Ministério da Saúde:** sob No 33308.0001/001-6.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

**Dominus**

43 3432.9500 / [www.dominusquimica.com.br](http://www.dominusquimica.com.br)

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial

86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná

